

Diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom (DLBCL)

R-CHOP versus DA-EPOCH-R bei unbehandeltem DLBCL, CALGB/Alliance 50303 (Abstract LBA-469) <https://ash.confex.com/ash/2016/webprogram/Paper97112.html>

Fragestellung

Führt eine intensivere Chemoimmuntherapie mit Dosis-adjustiertem EPOCH (Etoposid, Prednison, Vincristin, Cyclophosphamid, Doxorubicin) plus Rituximab zu einem besseren ereignisfreien Überleben?

Hintergrund

R-CHOP ist der Goldstandard bei Patienten mit DLBCL, in der GCB- und der ABC-Subgruppe, und auch bei anderen Formen aggressiver B-Zell-Lymphome. In einer multizentrischen Phase-II-Studie erreichte DA-EPOCH-R ein ereignisfreies Überleben nach 4 Jahren von 81%.

Ergebnisse

Risikogruppe	Kontrolle	Neue Therapie	N ¹	EFS ²	OS ³
DLBCL, unbehandelt	R-CHOP	DA-EPOCH-R	524	n. s.	n. s.

¹ N - Anzahl Patienten; ²EFS – ereignisfreie Überlebensrate nach 4 Jahren, in %; ³OS – Gesamtüberlebensrate nach 4 Jahren, in %;

Zusammenfassung der Autoren

In der Gesamtgruppe zeigte sich kein Unterschied zwischen R-CHOP und DA-EPOCH-R in Bezug auf das ereignisfreie und das Gesamtüberleben. DA-EPOCH-R war mit höherer Toxizität und einer höheren Abbruchrate belastet.

Kommentar

R-CHOP bleibt der Stand beim DLBCL. Die Analyse von molekularen Subgruppen steht aus.